






I		3 ↕ <2,5
II		4 ↕ 2,5-3,2
III		10 ↕ 3,6
IV		16 ↕ 4,1-4,5
V		25 ↕ >4,5

## Könsorgan (man) [\[redigera\]](#)

### Tanner I

Förpubertal ([testiklarnas](#) volym är mindre än 1,5 [ml](#); penis längd är 3 [cm](#) eller mindre).

### Tanner II

Testiklarnas volym är mellan 1,6 och 6 ml; skinnet på pungen blir tunnare, rodnar och förstoras; penis längd oförändrad.

### Tanner III


Testiklarnas volym är mellan 6 och 12 ml; pungen växer ytterligare; penis börjar bli längre, runt 6 cm.

### Tanner IV

Testiklarnas volym är mellan 12 och 20 ml; pungen växer ytterligare och mörknar; penis börjar bli längre, runt 10 cm och ökar i omkrets.

### Tanner V

Testiklarnas volym är större än 20 ml; fullvuxen pung och penis omkring 15 cm i längd.



## Bröst (kvinna) [redigera]

Tanner I

Ingen körtelvävnad ; [Vårtgården](#) (areola mammae) följer konturerna av det omgivande bröstskinnnet (förpubertal).

Tanner II

Det börjar bildas [bröstkörtlar](#) med liten omgivande area av körtelvävnad, vårtgården börjar sträcka ut sig.

Tanner III

Brösten börjar bli mer upphöjda och breder ut sig utanför vårtgårdarna, vilka fortsätter att utvidgas men fortsätter att vara i kontur med omgivande bröst.

Tanner IV

Ökad bröststorlek och upphöjning; [vårtgården](#) och [bröstvårtan](#) bildar en naturlig upphöjning från konturen på det omgivande bröstet.

Tanner V

Brösten når slutligen vuxen storlek; vårtgården återgår till konturen av det omgivande bröstet, med en centrerad upphöjd bröstvårta