

Läkemedelsordination - generella direktiv

Indikation	Läkemedel	Dosering	Kontraindikation	Övrig instruktion
TILLFÄLLIG SMÄRTA (huvudvärk, mensvärk)	T. Alvedon 500 mg (paracetamol)	1–2 tabl. vb, per os Max 8 tabl./dygn.	<ul style="list-style-type: none"> Leversjukdom Pågående beh. med andra läkemedel som innehåller paracetamol 	<ul style="list-style-type: none"> Ge råd om vätska, mat, vila Dokumentera och utvärdera. Notera ev. återkommande behov
FEBER	T. Ipren 400 mg (ibuprofen)	1 tabl. vb, per os Max 3 tabl./dygn	<ul style="list-style-type: none"> Överkänslighet mot NSAID. Graviditet 3:e trimestern. Blödningsbenägenhet Magsår/magkatarr Njursjukdom 	<ul style="list-style-type: none"> Ge råd om vätska, mat, vila Dokumentera och utvärdera. Notera ev. Återkommande behov.
ALLERGI/KLÅDA-lindriga besvär	T. Aerius 5 mg (desloratadin)	1 tabl. vb, per os Max 2 tabl./dygn		<ul style="list-style-type: none"> Observera elev ca 30 min vid lindrig reaktion, för att se effekten <i>Effekten kommer inom ca 30 min</i>
ALLERGI/KLÅDA-måttliga besvär	T. Betapred 0,5 mg	10 tabl. vb, per os Max 10 st.		<ul style="list-style-type: none"> Observera elev ca 30 min vid måttlig reaktion, för att se effekt samt för kontroll av allmäntillstånd och vitala parametrar <i>Långsam effekt inom ca 2 tim</i> <i>Ta kontakt med närmast anhörig</i>
ANAFYLAKTISK REAKTION Se PM – Anafylaktisk reaktion!	Inj. Emerade 500 µg/dos ELLER Inj. EpiPen 300 µg/dos	1 spruta ges i.m. i låret vid kraftig allergisk reaktion Kan upprepas efter 10 minuter.		Se PM – Anafylaktisk reaktion!

Ansvarig för generell ordination enligt ovan; Pernilla Fritz, Skolöverläkare, AcadeMedia Gymnasiesegmentet, pernilla.fritz@academedia.se