

Ordination av Hepatit B-vaccination

- Gäller endast elever på Vård -och Omsorgsprogrammet
- Ska användas av skolsköterskor inom gymnasiesegmentet, AcadeMedia
- Se dokumentet **Hepatit B – Bilaga** för bakgrund till denna vaccinationsrutin.

Som för alla injicerbara vacciner kan sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner till följd av administrering av vaccinet inträffa. Adekvat medicinsk behandling ska därför alltid finnas i beredskap.

Indikation	Läkemedel	Dosering	Kontraindik.	Övrig information
Hepatit B, grundvaccinering inför APL. Gäller enbart elever på Vård- och Omsorgsprogrammet	Engerix-B 20 µg/ml, förfylld spruta.	1 ml/dos. Totalt ges 3 doser. Ges i 0,1 och 6 mån-schema. (T.ex.Sept – Okt – April) Ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln, på utsidan av överarmen. Får ALDRIG ges intravenöst!	Överkänslighet mot någon komponent i vaccinet. Akut sjukdom med feber. .	Kan ges samtidigt som vaccin mot DTTPolio, MPR och HPV men ges då på olika inj.ställen. Max 2 vacciner/tillfälle.

Grad av serologiskt skydd vid månad 7 utifrån ovanstående 0,1 och 6 mån-schema = 96%!

Mycket vanliga biverkningar enligt FASS;

smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Ge råd om egenvård.

Vanliga biverkningar enligt FASS;

trötthet, huvudvärk och feber >37,5 samt sjukdomskänsla och symtom från GI-kanalen. Ge råd om egenvård.

Rapportering av sällsynta/mycket sällsynta biverkningar;

Rådgör med din skolläkare angående vidare handläggning om det uppkommit ovanliga biverkningar, se FASS, eller vid reaktion som inte ens kommenteras i FASS.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar även efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, <https://www.lakemedelsverket.se/sv>

Läkemedelsverket efterfrågar vissa uppgifter i anmälningsformuläret. T. ex. uppgifter om;

- dig som rapporterar
- den som drabbats av den misstänkta biverkningen
- vilket/vilka läkemedel som är misstänkta och vilka övriga läkemedel som man tar
- vilka de misstänkta biverkningarna är
- annan sjukdomshistorik för den drabbade personen.

Fyll i så många uppgifter som möjligt, det ger handläggarna en bättre helhetsbild av händelsen.