

Rutin vid inträffad risk för blodsmitta

Risk för smittspridning i skolan är mycket liten men risken kan dock aldrig helt uteslutas. Försiktighet uppvisas vid all hantering av blod för att undvika inokulation. Risk finns om man sticker sig eller skär sig på ett föremål som är förorenat med blod, till exempel efter vaccination av elev. Man kan också smittas om man får blod på ett öppet sår eller på slemhinna i mun eller öga.

Åtgärder

Har du stuckit eller skurit dig eller på annat sätt fått blod på öppet sår eller slemhinna:

- **När du stuckit dig**
Låt det blöda. Desinfektera rikligt med sprit vid insticksstället.
- **När du fått stänk i munnen eller i ögonen**
Skölj rikligt med vatten eller natriumklorid
- **När du fått stänk på skadad hud (eksem eller sår)**
Desinfektera med sprit.

- **Identifiera elev med namn och personnummer.**
Kontrollera om du har information om att hen har en blodsmitta eller kommer från ett land med ökad förekomst av hepatit B (de flesta länder utanför Nordamerika, Västeuropa och Australien).

- Kontakta genast din rektor/ arbetsledare så att hen direkt sätter dig i kontakt med företagshälsovården för vidare bedömning och åtgärd.
- Skriv en arbetsskadeanmälan. Blanketter hittar du [här](#).
- Skriv en avvikelse och skicka till MVC enligt gällande riktlinjer.